

التهاب الحافظ

DIAPER RASH



المملكة العربية السعودية
رئاسة الحرس الوطني الشؤون الصحية
مدينة الملك عبد العزيز الطبية

يغير قسم طب الأطفال من الأقسام الكبيرة في مستشفى الملك فهد للحرس الوطني التابع لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، ويضم هذا القسم عدداً كبيراً من الأطباء الاستشاريين في كافة تخصصات طب الأطفال الدقيقة - أمراض الحساسية ونقص المناعة، أمراض الغدد الصماء والسكري، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الأمراض الوراثية والاستقلالية، أمراض الدم والأورام، الأمراض المعدية، أمراض الكلى، أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض العصبية، الأمراض الصدرية، الامراض الروماتيزمية، الأمراض النفسية، وتخصص سلوكيات ونمو الأطفال وطب البلوغ والمراهقة، الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى العلاج المركز للأطفال، والعلاج المركز لحديثي الولادة والختج، وطب طوارئ الأطفال و أمراض الأطفال العامة . يوجد في المستشفى مختلف تخصصات جراحة الأطفال - الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، جراحة القلب، جراحة زراعة الأعضاء، جراحة الأعصاب، جراحة التجميل والحرق، جراحة العيون، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الفم والأسنان- بالإضافة إلى التخصصات الصحية المساندة وهناك أكثر من ٤٠ متربعاً في برنامج تخصص طب الأطفال للمقيمين وبرنامج الزمالات في تخصصات طب الأطفال الدقيقة وتدريب أطباء الامتياز وطلاب كلية الطب.

اقتبست معلومات هذه المطوية من مراجع و مصادر علمية موثوقة وتم تنقيحها بعناية من قبل لجنة التوعية والتثقيف الصحي في قسم طب الأطفال وبمشاركة الاستشاريين المتخصصين في موضوع المطوية .

قسم طب الأطفال (١٥١٠)

مستشفى الملك فهد للحرس الوطني

مدينة الملك عبد العزيز الطبية

ص. ب. ٢٢٤٩٠ الرياض

بريد إلكتروني : ped1@ngha.med.sa

موقع الإنترن特 : www.ngha.med.sa



بودرة التلك

الكثير من الأمهات يستخدمون بودرة التلك بوضعها على منطقة الحفاظ ، وذكر إن استخدام بودرة التلك بصورة مستمرة ومع كل غيار للحافظ أمر غير مرغوب لأنها لا تمنع حدوث التهاب الحفاظ وممكن أن تزيد نسبة الرطوبة . عند استخدام بودرة التلك تأكدو أن تضعوا علبة البوترة بعيداً عن متناول الطفل أو قرب وجهه لمنع سكبها عليه لأن البوترة قد تؤدي إلى اختناق تفسي حاد . يمكن منع حدوث ذلك بوضع البوترة في الكفين بعيداً عن الطفل ، ومن ثم وضعها على منطقة الحفاظ .

السلامة دائمًا

لا ترك الطفل وحيداً عند تغيير الحفاظ ، على طاولة الغيار أو أي سطح مرتفع عن الأرض ، فالطفل مهما كان صغيراً قادر على الحركة والانقلاب مما قد يؤدي إلى سقوطه وحدوث ضرر له لا قدر الله .

الطبيب أول

عند تغيير الحفاظ بعد كل تبول أو تبرز فإن طفلك غالباً لن يصاب بالتهاب الحفاظ ومن ثم لن يكون هناك ازعاج أو قلق ، ولكن عند حدوث التهاب الحفاظ وإستمراره بالرغم من اتباع الإرشادات فإن زيارة الطبيب تكون ذات أهمية لمعرفته بالأسباب المتعددة للتهاب الحفاظ ومن ثم الأخذ بنصائحه وعلاجه .

كيفية علاج التهاب الحفاظ

هناك خطوات يمكن أن تساعده على إزالة هذه الالتهابات

ومنها :

- تأكد من تغيير الحفاظ بعد كل تبول أو تبرز خاصة خلال نوم الطفل.
- لا تغلق الحفاظ بشدة لأنه يمنع مرور الهواء في منطقة الحفاظ خصوصاً ليلاً ويمكن زيادة دخول الهواء باستخدام حفاظ أكبر حجماً وعدم إغلاقه بشدة.
- اذهب المنطقة بإحدى الكريمات مثل أكسيد الزنك الذي يمكث على الجلد مدة أطول من المراهم الأخرى ويقوم بحماية الطبقة الجلدية من الرطوبة والمواد المهيجة في البول والبراز و مع كل غيار للحافظ تأكد من نظافة الجلد ، ثم ضع طبقة الكريم أو المرهم فوق منطقة الحفاظ .
- تجنب فرك جلد طفلك لتتطيفه أو تجفيفه ، واستخدم الماء المنسكب وامسح بخفه لإزالة بقايا البول والبراز.
- إذا استمر وجود التهاب الحفاظ أو ازداد سوءاً بعد الخطوات السابقة ، فيجب زيارة طبيب الأطفال ، فقد يكون السبب هو وجود التهاب بالفطريات ، مما يستدعي إعطاء الطفل علاج موضعي معين مثل كريمات الاهيدروكورتيزون والنساتين .

كيفية منع حدوث التهاب الحفاظ

يعصب التهاب الحفاظ أغلب الأطفال ، مما يؤدي إلى انزعاج الطفل وقلق الوالدين . ولكن هناك الكثير الذي يمكن عمله لجعل الطفل يحس بالارتياح إذا ما أصيب بالتهاب الحفاظ .

أسباب التهاب الحافظ

يوصف أي تهيج أو إحمرار جلدي في منطقة الحفاظ بالتهاب الحفاظ وهنالك أسباب متعددة منها:

- رطوبة الجلد في منطقة الحفاظ وعدم تجفيفها أو تركها لفترة قصيرة بدون حفاظ لتجف.
 - عدم تغيير الحفاظ مباشرة بعد البول أو البراز حيث تركها لمدة طويلة يؤدي إلى تهيج الجلد.
 - الإكثار من استخدام الصابون أو المناديل المعطرة في تنظيف منطقة الحفاظ .
 - استخدام المضادات الحيوية .
 - الالتهابات الفطرية أو البكتيرية .
- في أغلب الأحوال يظهر التهاب حفاظي بسيط بدون وجود أسباب واضحة ويختفي بدون اي علاج .